

Имиња на лековите		Препорачана доза за возрасни *	Вкупно таблети на ден
Комбинации со фиксни дози	0 5 10 15 20mm	Приближно на реалната големина.	
Атрипла (efavirenz + emtricitabine + tenofovir DF)		Една таблета, еднаш дневно. Се зема навечер, не со оброк со многу масти. Види инфо за посебните лекови.	1
Биктарви (bictegravir + TAF + emtricitabine)		Една таблета, еднаш дневно. Се зема со или без храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Евиплера (rilpivirine + emtricitabine + tenofovir DF)		Една таблета, еднаш дневно, со храна (400 kcal). Види инфо за посебните лекови.	1
Одефси (rilpivirine + emtricitabine + TAF)		Една таблета, еднаш дневно, со храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Триумек (dolutegravir + abacavir + lamivudine)		Една таблета, еднаш дневно. Се зема со или без храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Генвоја (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + TAF)		Една таблета, еднаш дневно. Се зема со храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Стрибилд (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir DF)		Една таблета, еднаш дневно, со храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Симтуза (darunavir + cobicistat + emtricitabine + TAF)		Една таблета, еднаш дневно, со храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Делстриго (dorzavirine + lamivudine + tenofovir DF)		Една таблета, еднаш дневно, со или без храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Довато (dolutegravir + lamivudine)		Една таблета, еднаш дневно, со или без храна. Види инфо за посебните лекови.	1
Џулука (dolutegravir + rilpivirine)		Една таблета, еднаш дневно, се зема со храна. Види инфо кај изделени лекови.	1

Двојни нуклеозиди: нуклеозидни или нуклеотидни инхибитори на реверзната транскриптаза (НИРТ)			
tenofovir DF 300 mg + emtricitabine 200 mg (Трувада [на сликата] или генерички) ++		Една таблета, еднаш дневно.	1
TAF (10 mg бел или 25 mg син) + emtricitabine (200 mg), Дескови Descovy		Една таблета, еднаш дневно.	1
abacavir 600 mg + lamivudine 300 mg (Кивекса (Kivexa) или генерички) ++		Една таблета, еднаш дневно.	1
АРВ инјекции (cabotegravir/rilpivirine инјекции со продолжено дејство (CAB/RPV-LA) и единечни нуклеозиди			
За повеќе информации за АРТ во форма на инјекции и за единечни нуклеозиди (кои ретко се користат) погледнете на задната страна.			

* Можат да се користат различни дози или формулации – секогаш провери ја дозата со фармацевтот.

++ Генеричките верзии може да се со различна боја или облик.

НИРТ: Ненуклеозидни инхибитори на реверзната транскриптаза (ненуклеозиди)			
efavirenz 600 mg или 200 mg (Сустива (Sustiva) [на сликата] или генерички) ++		1 x 600 таблета (или 3 x 200 капсули) еднаш дневно; навечер, не со оброк со многу масти.	1 таблета (или 3 капсули)
nevirapine PR 400 mg (Вирамун (Viramune) [на сликата] или генерички) ++		1 x 400 mg еднаш дневно. Се зема со или без храна.	1 x 400 mg
etravirine (100 mg или 200 mg) (Интеленс (Intelence))		2 x 100 mg или 1 x 200 mg, два пати дневно, со храна. Дисперзибилни во вода.	2 или 4
rilpivirine (Едурант (Edurant))		1 x 25 mg таблета, еднаш дневно, се зема со главниот оброк (500 kcal).	1
dorzavirine (Пифелтро (Pifeltro))		1 x 100 mg таблета, еднаш дневно, со или без храна.	1


ИНИ: инхибитори на интегразата			
raltegravir 400 mg (розов) и 600 mg (жолт) (Исентрес (Isentress))		1 x 400 mg, два пати дневно или 2 x 600 mg таблета, еднаш дневно. Се зема со или без храна.	2
dolutegravir (Тивикеј (Tivicay))*		1 x 50 mg таблета, еднаш дневно (или 1 x 50 mg два пати дневно). Со храна се зема доколку земате два пати дневно, инаку со или без храна.	1 или 2
elvitegravir и bictegravir ги има само во комбинирани таблети – види Стрибилд, Генвоја и Биктарви.			1


Инјекции cabotegravir-LA (Вокабрија (Vocabria) и rilpivirine - LA (Рекамбис (Rekambyls) со продолжено дејство			
Cabotegravir + rilpivirine-LA (Вокабрија (Vocabria) + Рекамбис (Rekambyls))		Две инјекции во мускул (во задница) секои два месеци. Првиот месец може да се користат апчиња орално.	нема

б/ИП: засилени инхибитори на протеазата			
atazanavir * (Пејатаз (Reyataz))		1 x 300 mg капсула + засилувач, еднаш дневно. Со храна. Достапни се и капсули од 150 mg и од 200 mg.	1 (+1 бустер)
darunavir 600 mg (портокалов) и 800 mg (црвен), (Презиста (Prezista) **)		1 x 800 mg + бустер еднаш дневно (или 1 x 600 mg + 100 mg бустер два пати дневно со резистентност). Се зема со храна.	1 или 2 (+1 или 2 бустер)
atazanavir/cobicistat (Евотаз (Evotaz))		1 таблета, еднаш дневно. Се зема со храна.	1
darunavir/cobicistat (Резолста (Rezolsta))		1 таблета, еднаш дневно. Се зема со храна.	1

Фармакокинетички засилувачи (бустери)			
cobicistat (/c) (Тибост (Tybost))		150 mg таблета, еднаш дневно. Се користи за засилување на дејството на atazanavir, darunavir и elvitegravir.	Зависи од засилениот лек
ritonavir (/r) *** (Норвир (Norvir))		Таблети од 100 mg кои се користат во различни дози за да се засилат другите инхибитори на протеазата.	Зависи од ИП

Имиња на лековите Препорачана доза за возрасни * Вкупно таблети на ден

Инхибитори на влезот			
maraviroc* (Селсентри (Celsentri))		150 mg или 300 mg или 600 mg, според упатствата, во зависност од другите APB лекови во комбинацијата.	1 или 2 или 4
fostemsavir (Рукобија (Rukobia))		600 mg таблета, два пати дневно	2

bNAbs (широко неутрализирачко моноклонално антители) – како третман заснован на имунитет			
ibalizumab (Трогарзо (Trogarzo))	 (намалено)	150 mg/mL се даваат како еднократна венска инфузија секои две седмици.	Зависи од кои други лекови се користат

Единечни нуклеозиди (НИПТ)			
lamivudine (ЗТЦ) ++ (Епивир (EpiVir) [на сликата] или генерички)		1 x 300 mg (прикажано) или 2 x 150 mg, (се зема како доза еднаш на ден или два пати на ден).	1 ако 300 mg 2 ако 150 mg
abacavir ++ (Зиаген (Ziagen) [на сликата] или генерички)		2 x 300 mg таблети (се зема како доза еднаш на ден или два пати на ден).	2
emtricitabine (FTC) (Емтрива (Emtriva))		1 x 200 mg капсула, еднаш на ден	1
tenofovir DF* ++ (Виреад (Viread) [на сликата] или генерички)		1 x 300 mg таблета, еднаш на ден.	1

Забелешки

Ако поголемите таблети се тешки за голтање, кај возрасните можат да се користат педијатриски формулации. Понекогаш се достапни гранули или течности. Сликите ја прикажуваат приближно вистинската големина.

Лекови што помалку се користат

Информациите за постарите лекови за ХИВ што сега ретко се користат се достапни онлајн.
<http://i-base.info/guides/category/arvs>

Ваквите лекови се zidovudine (AZT), stavudine (d4T), zidovudine со lamivudine, Тризивир (Trizivir), lopinavir/r, fosamprenavir, tipranavir и efuvirtide (T-20).

Идни лекови и комбинации

Ако во меѓувреме се одобрат нови лекови, информациите ќе бидат објавени онлајн.
<http://i-base.info/guides/category/arvs>


АНТИРЕТРОВИРУСНИ ЛЕКОВИ

2022/23

Јуни 2022 г.



ЗАЕДНО ПОСИЛНИ
070 235 632



www.i-Base.info



Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ
Скопје



www.hivpa.org

Додаток на Вовед во АРТ од I-Base